MODE D'EMPLOI

HYPOZALIX®
Sécheresse buccale ou xérostomie
d'origine médicamenteuse ou post-radiothérapique

COMPOSITION: **pour 100 mL**

Chlorure de potassium .....62,450 mg
Chlorure de sodium .....86,550 mg
Chlorure de magnésium .....5,875 mg
Chlorure de calcium .....16,625 mg
Phosphate dipotassique .....80,325 mg
Phosphate monopotassique .....32,600 mg
Additifs : sorbitol, carboxyméthylcellulose sodique, eau purifiée. Conservateur: parahydroxybenzoate de méthyle (E218). Gaz propulseur: Azote.

FORME ET PRESENTATION:
Solution pour pulvérisations endobuccales, flacon pressurisé de 100 ou 50 mL. Dispositif médical conforme aux exigences de la directive 93/42/CEE.

INDICATIONS:
HYPOZALIX® est un substitut salivaire destiné au traitement de la symptomatologie de la sécheresse buccale (xérostomie) caractérisée par une hyposialie (réduction du flux salivaire) ou une asialie (absence de sécrétion salivaire) secondaire à un traitement médicamenteux ou à l'irradiation des voies supérieures aéro-digestives.

QU'EST-CE QUE LA XEROSTOMIE ?
La xérostomie est la sensation de sécheresse buccale consécutive à une réduction (hyposialie) ou à une absence (asialie) de flux salivaire induite par des médicaments ou par l'irradiation des voies supérieures aéro-digestives ou, plus rarement par une maladie auto-immune (syndrome de Gougerot-Sjögren). Non traitée, elle se matérialise par une altération de la muqueuse buccale associée, à terme, à un déficit de minéralisation des dents et s'accompagne de symptômes locaux qui affectent la qualité de vie des patients voire leur état de santé générale. La xérostomie nécessite un suivi médical.

MODE D'EMPLOI:
A utiliser en pulvérisations endobuccales (chaque pulvérisation doit être dirigée, alternativement, vers l'intérieur d'une joue).
Une pulvérisation sur la face interne de chaque joue 6 à 8 fois par jour.
L'administration doit être répétée chaque fois qu'il existe une sensation de bouche sèche. IMPORTANT: tenir le flacon vertical diffuseur vers le haut lors de la pulvérisation selon le schéma. En effet, **toute autre position lors de l'utilisation peut entraîner la vidange du gaz propulseur et rendre le flacon inutilisable malgré la présence de produit restant dans le flacon**.



PRECAUTIONS D'EMPLOI:
Afin d'éviter toute interaction avec d'autres produits, signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.
Dans certains cas (notamment syndrome de Gougerot-Sjögren), il convient d'observer une hygiène bucco-dentaire stricte associée à un traitement local prescrit par votre médecin ou votre dentiste.
Ce produit contient comme conservateur du parahydroxybenzoate de méthyle de la famille des parabens. Chez certaines personnes les parabens peuvent provoquer des réactions allergiques.
Ne pas laisser à la portée des enfants.

CONTRE-INDICATIONS:
Il n'y a pas de contre-indication connue.

EFFETS NON SOUHAITES OU GÊNANTS:
De très rares cas de picotements, nausées ou brûlures ont été signalés. Ces phénomènes, dont l'apparition est exceptionnelle, disparaissent spontanément à l'arrêt du traitement.

GROSSESSE OU ALLAITEMENT:
HYPOZALIX® peut être utilisé au cours de la grossesse ou de l'allaitement.

UTILISATION CHEZ L'ENFANT:
Les enfants ne devraient pas avoir besoin d'utiliser HYPOZALIX. Néanmoins si elle est nécessaire, l'utilisation d'HYPOZALIX est possible chez l'enfant.

CONSERVATION:
Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant en clair sur l'emballage.
Ne pas exposer à plus de 50°C.
Ne pas percer ou brûler, même après usage.

FABRICANT:
BIOCODEX
7 avenue Gallieni
94250 Gentilly - France

DISTRIBUTEUR:
BIOCODEX Benelux NV/SA - Rue des Trois Arbres 16A - 1180 Bruxelles - Belgique
Tél : 02 370 47 90 - info@biocodex.be

DATE DE MISE A JOUR DE CETTE NOTICE : Janvier 2010.

Sigle CE

CE

0459